



Simply. Grow. Together

PT. ROYAL AGRO INDONESIA  
Menara 165, Lt. 12 A, Unit B  
Jl. T. B. Simatupang, Kav.1, Cilandak Timur  
Jakarta Selatan 12560  
Telp. : +62 21 2940 6633  
Fax. +62 21 2940 6634  
Website: www.royalagroindonesia.com



# SPHINX<sup>®</sup> 500 SC

Teknologi berbeda, optimal hasilnya



FUNGISIDA

Fungisida yang bersifat protektif, baik untuk perlakuan benih maupun aplikasi penyemprotan.

Fungisida dengan teknologi terbaru untuk perlakuan benih pada tanaman jagung dan efektif untuk mengendalikan berbagai macam penyakit pada tanaman sayuran.

Hubungi kami untuk solusi terbaik.



Simply. Grow. Together.

royalagroindonesia.com



Didukung solusi berbagai inovasi agro teknologi yang telah diterapkan di banyak negara.



# SPHINX<sup>®</sup> 500 SC

Teknologi berbeda, optimal hasilnya



Tersedia dalam kemasan:

20 L  
100 ml  
50 ml

### Multifungsi

Dapat aplikasi sebagai fungisida perlakuan benih (*seed treatment*) dan aplikasi penyemprotan (*foliar spray*).

### Teknologi Unik

Berbeda dengan kompetitor, berbeda teknologi untuk bahan aktif sehingga menghasilkan perlindungan dan kontrol penyakit lebih optimal.

### Aman dan Terbukti

Sangat aman untuk benih jagung dan efektif untuk mengendalikan penyakit pada tanaman sayuran.

- Fungisida sistemik lokal dengan perlindungan yang baik dan juga bersifat *antisporelasi*.
- Efektif mengendalikan cendawan golongan *oomycetes* seperti: *Peronospora spp.* dan *Phytophthora infestans*.
- Dapat diaplikasikan secara perlakuan benih (*Seed Treatment*) dan penyemprotan pada daun (*Foliar Application*).

### Penyakit Sasaran

Bulai jagung,  
Busuk daun.



### Cara Aplikasi

Perlakuan benih jagung sebelum tanam.


Untuk metode penyemprotan gunakan sesuai dengan label dosis.

Tidak turun hujan dalam 6 jam setelah aplikasi.

Untuk hasil optimal perlu digunakan air bersih untuk aplikasi.

### Petunjuk Penggunaan

TANAMAN	PENYAKIT	KONSENTRASI FORMULASI
Jagung	Bulai jagung <i>Peronospora spp.</i>	7,5-10 ml/Kg benih
Kentang	Busuk daun <i>Phytophthora infestans</i>	0,5 - 1 ml/L



**PERHATIAN**  
BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI  
SIMPAN DITEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKALAN ANAK-ANAK